

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 1 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
ABIK EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	12 meses tras su apertura (P)	
ABILIFY	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml	OTSUKA PHARMACEUTICAL	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ACTIMAG	400 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	FAES FARMA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ACTITHIOL MUCOLITICO ANTIHISTAMINICO	SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	ALMIRALL S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ACTITHIOL MUCOLITICO INFANTIL	20 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	ALMIRALL S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ADOLONTA	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 30 ml	GRÜNENTHAL PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	12 meses tras su apertura (P)	
AERIUS	0,5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	ORGANON SALUD, S.L.	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	3 meses tras su apertura (CE)	
ALDOBRONQUIAL	2 mg/5 ml JARABE 1 FRASCO 100 ml	ALDO UNION	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ALERGOLIBER	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	PFIZER	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ALERLISIN	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	MENARINI	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ALERLISIN	10 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 20 ml	MENARINI	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ALGIDRIN PEDIATRICO	20 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml	FARDI	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	12 meses tras su apertura (P)	
ALGIDRIN PEDIATRICO	40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 150 ml	FARDI	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	12 meses tras su apertura (P)	
ALMAX	1 g/7,5 ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 225 ml	ALMIRALL S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 2 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
AMBROXOL CINFA	x mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
AMBROXOL NORMON EFG	3 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
AMBROXOL STADA EFG	6 mg/ml JARABE 1 FRASCO 250 ml	STADA S. L	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ANGITUSS	6 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	ALFASIGMA ESPAÑA S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
APIREDOL	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	IONFARMA	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
APIRETAL	100 mg/ml SOLUCION ORAL	ERN	No conservar a temperatura superior a 25°C (DL-T, P)	6 meses tras su apertura (P)	
APIROFENO	40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 150 ml	ERN	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
APIROFENO	40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 50 ml	ERN	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
APIROFENO	40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml	ERN	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
APOXOL EFG	3 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	AUROVITAS SPAIN S.A.U.	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ARIPIPRAZOL AUROVITAS EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml	AUROVITAS SPAIN S.A.U.	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
ARIPIPRAZOL CINFA EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
ARIPIPRAZOL NORMON EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml	NORMON	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	6 meses tras su apertura (P)	
ATARAX	2 mg/ml JARABE 1 FRASCO 150 ml	UCB PHARMA, S.A.	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 3 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
AXURA	5 mg/PULSACION SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml (200 DOSIS)	MERZ THERAPEUTICS	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	3 meses tras su apertura (P)	
BALSOPRIM	26,6 mg/ml + 5,4 mg/ml + 0,5 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 150 ml	DESMA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
BANDOL	12,5 mg/PULSACION SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 30 ml	RUBIO	No requiere condiciones especiales (P)	12 meses tras su apertura (P)	
BENORAL	250.000 UI/5 ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 100 ml	REIG JOFRE	Conservar en nevera entre 2°C y 8°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
BESITRAN	20 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION ORAL 1 FRASCO 60 ml	VIATRIS HEALTHCARE S.L.	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	28 días tras su apertura (P)	
BETAMETASONA SONPHAR EFG	0,5 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 30 ml	SONPHAR	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	3 meses tras su apertura (P)	
BICASAN	2 mg/ml JARABE 1 FRASCO 250 ml	PHARMINICIO	No congelar (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	No utilizar si observa que el líquido no es transparente (P)
BILAXTEN	2,5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	FAES FARMA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
BIODRAMINA INFANTIL	4 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 60 ml	URIACH CONSUMER HEALTHCARE	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
BISOLVON ANTITUSIVO	2 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	OPELLA HEALTHCARE SPAIN, S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
BISOLVON ANTITUSIVO COMPOSITUM	3 mg/ml + 1,5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	OPELLA HEALTHCARE SPAIN, S.L.	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	6 meses tras su apertura (P)	
BISOLVON MUCOLITICO	1,6 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	OPELLA HEALTHCARE SPAIN, S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	12 meses tras su apertura (P)	
BRINTELLIX	20 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 15 ml	LUNDBECK ESPAÑA	No requiere condiciones especiales (P)	8 semanas tras su apertura (P)	
BRIVIACT	10 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml	UCB PHARMA, S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	8 meses tras su apertura (P)	
BRONCHOSTOP ANTITUSIVO Y EXPECTORANTE	SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	PERRIGO ESPAÑA S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	4 semanas tras su apertura (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 4 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
BRONCHOSTOP NITE	SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	PERRIGO ESPAÑA S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	2 meses tras su apertura (P)	
BRONCOMEDICAL CON SULFOGUAYACOL	2 mg/ml + 10 mg/ml JARABE 1 FRASCO 180 ml	MEDICAL	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
BRONCOVIR	SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 150 ml	INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA VIR	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
BRONQUIDIAZINA CR	SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 150 ml	FAES FARMA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
BROXIVAN EFG	3 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml	MEDOCHEMIE IBERIA, S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
BROXIVAN EFG	6 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	MEDOCHEMIE IBERIA, S.A.	No requiere condiciones especiales. No congelar (P)	6 meses tras su apertura (P)	
CARNICOR	300 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 40 ml	ALFASIGMA ESPAÑA S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
CARVOMIN	GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 20 ml	ARISTO PHARMA IBERIA S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
CASENLAX	500 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	CASEN RECORDATI S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	2 meses tras su apertura (P)	
CETIRIZINA CIPLA EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml + CUCHARILLA DOSIFICADORA	CIPLA EUROPE NV	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
CETIRIZINA SANDOZ EFG	10 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 20 ml	SANDOZ FARMACEUTICA S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	12 meses tras su apertura a temperatura ambiente (P)	
CETIRIZINA TEVA EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	TEVA PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura (P)	
CETRAXAL	100 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 100 ml	SALVAT	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
CIDINE	1 mg/5 ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 250 ml	CASEN RECORDATI S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 5 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
CINFAHELIX	JARABE 1 FRASCO	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura siempre y cuando se conserve a temperatura inferior a 25°C (P)	
CINFAMUCOL CARBOCISTEINA	50 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	CINFA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
CINFATOS	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
CINFATOS COMPLEX	SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 125 ml	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
CINFATOS DESCONGESTIVO	SOLUCION ORAL 1 FRASCO 125 ml (VIDRIO)	CINFA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	18 meses desde su apertura (P)	
CINFATOS DESCONGESTIVO	SOLUCION ORAL 1 FRASCO	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
CINFATOS EXPECTORANTE	2 mg/ml + 20 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
CINFATOS INFANTIL	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 125 ml	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
CINFATOS NOCHE	1,33 mg/ml + 2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
CINFATUSINA	3,54 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	18 meses desde su apertura (P)	
CIPRALEX	20 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 15 ml	LUNDBECK ESPAÑA	No requiere condiciones especiales (P)	8 semanas tras su apertura si se conserva a temperatura inferior a 25°C (P)	
CITRAFLEET	SOLUCION ORAL 2 BOTELLAS 160 ml	CASEN RECORDATI S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
CLEBORIL	100 microgramos/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	ALMIRALL S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
CLEBORIL PEDIATRICO	62,5 microgramos/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 90 ml	ALMIRALL S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 6 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
CLOPERASTINA KERN PHARMA	3,54 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	12 meses tras su apertura (P)	
CLOPERASTINA NORMON EFG	3,54 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO	NORMON	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
CLOPIXOL	20 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 20 ml	LUNDBECK ESPAÑA	Conservar en nevera entre 2°C y 8°C (P)	6 semanas tras su apertura si se conserva a temperatura inferior a 25°C y protegido de la luz (P)	
CODEISAN	1,26 mg/ml JARABE 1 FRASCO 250 ml	TEVA PHARMA	Conservar en el envase original perfectamente cerrado (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
CODINEX	1 mg/ml + 1 mg/ml + 6,67 mg/ml JARABE 1 FRASCO 125 ml	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
DALSY	x mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO	VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	12 meses tras su apertura (P)	
DAPAROX	33 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 20 ml	ANGELINI PHARMA ESPAÑA S.L.U.	No requiere condiciones especiales (P)	56 días tras su apertura (P)	
DEKRISTOLAN	20.000 UI/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	MIBE PHARMA ESPAÑA	Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	12 meses tras su apertura (P)	
DELCRIN	25.000 UI SOLUCION ORAL 1 ENVASE UNIDOSIS 2,5 ml	RUBIO	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
DELCRIN	10.000 UI/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	RUBIO	Conservar en el envase original para protegerlo de la luz. No congelar (P)	5 meses tras su apertura (P)	
DELTUIS	10.000 UI/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	ITALFARMACO	No conservar a temperatura superior a 30°C. No congelar ni refrigerar. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	6 meses tras su apertura (P)	No utilice si observa que la solución está turbia
DEPAKINE	200 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 40 ml	SANOFI AVENTIS S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (DL-T, P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t, P)	
DESARROL	50 mg/ml + 25 mg/ml + 0,2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	FAES FARMA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 7 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
DESLORATADINA KERN PHARMA EFG	0,5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	KERN PHARMA	No congelar. Conservar en el envase original (P)	6 meses tras su apertura (P)	No utilice si observa algún cambio en el aspecto de la solución oral
DESLORATADINA NORMON EFG	0,5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales. No congelar (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	No utilice si observa algún cambio en el aspecto de la solución oral
DESLORATADINA SANDOZ EFG	0,5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	SANDOZ FARMACEUTICA S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	2 meses tras su apertura (P)	No utilice si observa algún cambio en el aspecto de la solución oral
DESLORATADINA STADA EFG	0,5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml + JERINGA DOSIFICADORA	STADA S. L	No requiere condiciones especiales (P)	2 meses tras apertura (P)	No utilice si observa algún cambio en el aspecto de la solución oral
DESLORATADINA TARBIS EFG	0,5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	TARBIS FARMA, S.L.	No requiere condiciones especiales. No congelar. No conservar a temperatura superior a 25°C. (P)	48 días tras su apertura. No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	
DESLORATADINA VIATRIS EFG	0,5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	2 meses tras su apertura (P)	Si observa algún cambio en el aspecto de la solución oral, comuníquese a su farmacéutico/a
DEVIK	10.000 UI/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
DEZACOR	22,75 mg/ml GOTAS ORALES EN SUSPENSION 1 FRASCO 13 ml	FAES FARMA	No requiere condiciones especiales (P)	1 mes tras su apertura (P)	
DIAZEPAN PRODES	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
DIEMIL	1 g/5 ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 180 ml	ALMIRALL S.A.	Conservar el frasco en un lugar templado. No debe guardarse en nevera ni en sitios fríos (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
DIERTINE	2 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 50 ml	TORA LABORATORIES	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
DIFENATIL INFANTIL	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 60 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales (P)	12 meses tras su apertura (P)	
DIFENATIL INFANTIL	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 90 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 8 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
DINOBRXOL	3 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	WAAS-ANITA S.A.	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	12 Meses tras su apertura (P)	
DIOVAN	3 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 160 ml	NOVARTIS FARMACEUTICA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	3 meses tras su apertura (P)	
DIPREX EFG	20 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 15 ml	INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA VIR	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	8 semanas tras su apertura (P)	
DOLOSTOP PEDIATRICO	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
DROPIZOL	10 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	PHARMANOVA	No requiere condiciones especiales (P)	4 semanas tras su apertura (P)	
DULCOLAXO PICOSULFATO	7,5 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 30 ml	OPELLA HEALTHCARE SPAIN, S.L.	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	3 meses tras su apertura (P)	
DUPHALAC	667 mg/ml SOLUCION ORAL 1 BOTELLA	VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C (DL-T, P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t, P)	Puede producirse oscurecimiento del color propio de las soluciones azucaradas sin afectar la acción
EBASTEL	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	ALMIRALL S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
EBIXA	5 mg/PULSACION SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml (200 DOSIS)	LUNDBECK ESPAÑA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	3 meses tras su apertura (P)	
EFETAMOL	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 60 ml	ITALFARMACO	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
EFFERALGAN	30 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 90 ml	NEWLINE PHARMA S.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ELIXIFILIN	5,33 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 250 ml	TORA LABORATORIES	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
EPIDYOLEX	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	JAZZ PHARMACEUTICALS IBERIA S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	12 semanas tras su apertura (P)	
ESBERIVEN	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	FAES FARMA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ESCITALOPRAM CINFA EFG	20 mg/ml GOTAS ORALES EN	CINFA	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	8 semanas tras su apertura (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.



# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 9 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
	SOLUCION 1 FRASCO 15 ml				
ESCITALOPRAM KERN PHARMA EFG	20 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 15 ml	KERN PHARMA	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	8 semanas tras su apertura (P)	
ESERTIA	20 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 15 ml	ALMIRALL S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	8 semanas tras su apertura (P)	
ESTILSONA	7 mg/ml GOTAS ORALES EN SUSPENSION 1 FRASCO 10 ml	SONPHAR	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)(CE)	Fecha de caducidad que aparece en el envase (P)(CE)	
ESTILSONA	7 mg/ml GOTAS ORALES EN SUSPENSION 1 FRASCO 30 ml	ERN	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)(CE)	Fecha de caducidad que aparece en el envase (P)(CE)	
ETALPHA	2 microgramos/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	RUBIO	Conservar en nevera entre 2°C y 8°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
EVACUOL	7,5 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 30 ml	TEOFARMA S.R.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
EXELON	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	NOVARTIS FARMACEUTICA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	1 mes tras su apertura (P)	
EZOR	7,5 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 25 ml	LAINCO	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
FEBROVIR	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA VIR	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
FINTEPLA	2,2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	UCB PHARMA, S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura (P)	
FLAGYL	125 mg/5 ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 120 ml	SANOFI AVENTIS S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	8 días tras su apertura (P)	
FLUDAN CODEINA	10 mg/5 ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	FAES FARMA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
FLUIDASA	5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 250 ml	TEOFARMA S.R.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
FLUIDASA	20 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 30 ml	TEOFARMA S.R.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 10 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
FLUIDIN MUCOLITICO	50 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	FAES FARMA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
FLUIMUCIL	40 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	ZAMBON	No requiere condiciones especiales (P)	15 días tras su apertura (P)	
FLUIMUCIL PEDIATRICO	20 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	ZAMBON	No requiere condiciones especiales (P)	15 días tras su apertura (P)	
FLUOXETINA NORMON EFG	20 mg/5 ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	NORMON	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
FLUTOX	3,54 mg/ml JARABE 1 FRASCO	ZAMBON	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t, P)	
FRISPEC	6,5 mg/ml JARABE 1 FRASCO 150 ml	FARLINE	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
FRITUSIL	3 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml	FARLINE	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
FURANTOINA	10 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 80 ml	ERN	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
FYCOMPA	0,5 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 340 ml	EISAI FARMACEUTICA	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura (P)	Agitar antes de usar
GALANTAMINA NORMON EFG	4 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura (P)	
GAMALATE B (6)	SOLUCION ORAL 1 FRASCO 80 ml	FERRER INTERNACIONAL	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
GAMAVAN	360 microgramos/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 15 ml	GP-PHARM, S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	8 semanas tras su apertura (P)	
GELOCATIL PEDIATRICO	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 60 ml	FERRER INTERNACIONAL	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
GLUTAFERRO	170 mg (30 mg/ml) GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 25 ml	MEDIX	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 11 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
HALOPERIDOL ESTEVE	2 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO	ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.	Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
HALOPERIDOL PRODES	2 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
HEMANGIOL	3,75 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	PIERRE FABRE IBERICA	No requiere condiciones especiales (P)	2 meses tras su apertura (P)	
HIDROFEROL	0,1 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO	FAES FARMA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
HIDROPOLIVIT	GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 20 ml	MENARINI	No conservar a temperatura superior a 25°C (FT)	6 meses tras su apertura (P)	
HISTAVERIN	2 mg/ml JARABE 1 FRASCO 250 ml	ESTEDI	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
HODERNAL	800 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml	VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
IBEROGAST	GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 20 ml	BAYER HISPANIA S.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	8 semanas tras su apertura (P)	
IBIS	2,5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	MENARINI	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	6 meses tras su apertura (P)	
IBLASIN	20 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO	ITALFARMACO	No requiere condiciones especiales (P)	9 meses tras su apertura (P)	
IBUDOL PEDIATRICO	40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 150 ml + JERINGA ORAL	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
IBUDOL PEDIATRICO EFG	20 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
IBUPROFENO ALDO UNION EFG	20 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml	ALDO UNION	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
IBUPROFENO BENEL	20 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml	EXPANSCIENCE	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
IBUPROFENO CINFA EFG	20 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 12 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
IBUPROFENO CINFA EFG	40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO	CINFA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	6 meses tras su apertura (P)	
IBUPROFENO CODRAMOL EFG	20 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml	FARMALIDER	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
IBUPROFENO FARMALID EFG	20 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml	FARMALIDER	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
IBUPROFENO KERN PHARMA EFG	40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura siempre y cuando se conserve por debajo de 30°C (P)	
IBUPROFENO NORMON EFG	40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO	NORMON	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ILVIGRIP NOCHE	JARABE 1 FRASCO 180 ml	VICKS	Conservar en el envase original perfectamente cerrado y protegido de la luz (P)	1 año tras su apertura (P)	
INISTOLIN PEDIATRICO TOS Y CONGESTION	2 mg/ml + 6 mg/ml JARABE 1 FRASCO 120 ml	JNTL CONSUMER HEALTH SPAIN S.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
INISTON MUCOSIDAD	20 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml (SABOR MENTA)	JNTL CONSUMER HEALTH SPAIN S.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	4 semanas tras su apertura (P)	
INISTON MUCOSIDAD Y CONGESTION	20 mg/ml + 6 mg/ml JARABE 1 FRASCO	JOHNSON & JOHNSON	No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
INISTON TOS	1,5 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	JNTL CONSUMER HEALTH SPAIN S.L.	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
INISTON TOS Y CONGESTION	JARABE 1 FRASCO 200 ml	JOHNSON & JOHNSON	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
INOVELON	40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 460 ml	EISAI FARMACEUTICA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	90 días tras su apertura (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 13 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
JARABE DEL DR. MANCEAU	1 FRASCO	ALCOR	No requiere condiciones especiales. Conservar en envase original (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
JIAX SEMANAL	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 35 ml	GEBRO PHARMA	No conservar a temperatura superior a 25°C. No refrigerar. Conservar el frasco en el envase original para protegerlo de la luz (P)	6 meses tras su apertura (P)	
JUANOLTUS EXPECTORANTE	7 mg/ml JARABE 1 FRASCO 100 ml	ANGELINI PHARMA ESPAÑA S.L.U.	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
JUNIFEN	40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 150 ml (SABOR NARANJA)	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	6 meses tras su apertura (P)	
KALOBA	JARABE 1 FRASCO 100 ml	SCHWABE FARMA IBERICA S.A.U.	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
KALOBA	GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 50 ml	SCHWABE FARMA IBERICA S.A.U.	No conservar a temperatura superior a 30°C y en lugar fresco (P)	6 meses tras su apertura (P)	
KEPPRA	100 mg/ml SOLUCION ORAL	UCB PHARMA, S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	7 meses tras su apertura (P)	
KEPPRA DIFARMED	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml + JERINGA ORAL 10 ml	DIFARMED	No requiere condiciones especiales (P)	Desde un punto de vista microbiológico, el producto debe utilizarse inmediatamente después de su dilución. (P)	En caso de no ser usado inmediatamente, el tiempo y condiciones de almacenaje previas al siguiente uso son responsabilidad del usuario y no deben ser superiores a 24 horas entre 2 y 8°C, a menos que la dilución se haya realizado en condiciones asépticas validadas y controladas (P)
LACTULOSA LAINCO EFG	666 mg/ml SOLUCION ORAL	LAINCO	No requiere condiciones especiales. No congelar. Conservar en el envase original (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	Puede producirse un oscurecimiento del color, lo cual es característico de las soluciones azucaradas y no afecta a la acción terapéutica (P)
LAITOS	3 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	LAINCO	Conservar el envase perfectamente cerrado y conservar protegido de la luz. No congelar	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 14 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
LANACORDIN PEDIATRICO	0,05 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 60 ml	KERN PHARMA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
LAPRYSTA EFG	10 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	NEURAXPHARM SPAIN S.L.	No refrigerar (P)	2 meses tras su apertura (P)	
LARGACTIL	40 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 30 ml	NEURAXPHARM SPAIN S.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
LAURAK EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml + JERINGA 10 ml	NEURAXPHARM SPAIN S.L.	No requiere condiciones especiales (FT)	6 meses tras su apertura (P)	
LEVETIRACETAM ARISTO EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO X ml + JERINGA ORAL	ARISTO PHARMA IBERIA S.L.	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
LEVETIRACETAM AUROVITAS EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml + JERINGA ORAL 10 ml	AUROVITAS SPAIN S.A.U.	No requiere condiciones especiales (FT)	7 meses tras su apertura (P)	
LEVETIRACETAM CINFA EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml + JERINGA ORAL 10 ml	CINFA	No requiere condiciones especiales (FT)	2 meses tras su apertura (P)	
LEVETIRACETAM KERN PHARMA EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml + JERINGA ORAL 12 ml	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (FT)	7 meses tras su apertura (P)	
LEVETIRACETAM NORMON EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml + JERINGA ORAL 5 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales (FT)	6 meses tras su apertura (P)	
LEVETIRACETAM RATIOPHARM EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml + JERINGA ORAL 10 ml	TEVA PHARMA	No requiere condiciones especiales (FT)	4 meses tras su apertura (P)	
LEVETIRACETAM SANDOZ EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml + JERINGA ORAL 10 ml	SANDOZ FARMACEUTICA S.A.	No requiere condiciones especiales (FT)	7 meses tras su apertura (P)	
LEVETIRACETAM STADA EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml + JERINGA ORAL 10 ml	STADA S. L	No requiere condiciones especiales (FT)	7 meses tras su apertura (P)	
LEVETIRACETAM TARBIS EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO X ml + JERINGA ORAL	TARBIS FARMA, S.L.	No requiere condiciones especiales (FT)	7 meses tras su apertura (P)	
LEVETIRACETAM TARBIS FARMA EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 300 ml + JERINGA ORAL 10 ml	TARBIS FARMA, S.L.	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 15 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
LEVETIRACETAM TECNIGEN EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO X ml + JERINGA ORAL	TECNIMEDE ESPAÑA	No requiere condiciones especiales (FT)	3 meses tras su apertura (P)	
LOMPER	20 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 30 ml	ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
LORATADINA NORMON EFG	1 mg/ml JARABE 1 FRASCO 120 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
LUBRILAX	7,5 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 30 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
MAGNESIA CINFA	200 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 260 ml	CINFA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
MAGNESIA LAINCO	200 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 220 ml	LAINCO	No requiere condiciones especiales (FT)	2 meses tras su apertura (P)	
MAPOLI EFG	25 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	VISO FARMACEUTICA S.L.	Conservar en nevera entre 2°C y 8°C (P)	3 meses tras su apertura (P)	
MAYGACE ALTAS DOSIS	40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 240 ml	ZENTIVA	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
MEMANTINA ARISTO EFG	10 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	ARISTO PHARMA IBERIA S.L.	No requiere condiciones especiales (FT)	6 meses tras su apertura (P)	
MEMANTINA AUROVITAS SPAIN EFG	5 mg/PULSACION SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	AUROVITAS SPAIN S.A.U.	No requiere condiciones especiales (FT)	3 meses tras su apertura (P)	
MEMANTINA CINFA EFG	5 mg/PULSACION SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	CINFA	No requiere condiciones especiales (FT)	3 meses tras su apertura (P)	
MEMANTINA KERN PHARMA EFG	10 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (FT)	2 meses tras su apertura (P)	
MEMANTINA STADA EFG	5 mg/PULSACION SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	STADA S. L	No requiere condiciones especiales (FT)	3 meses tras su apertura (P)	El frasco con el dosificador montado debe guardarse y transportarse únicamente en posición vertical (P)
MEMANTINA VIATRIS EFG	5 mg/PULSACION SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L.	No requiere condiciones especiales (FT)	3 meses tras su apertura (P)	
METALGIAL	500 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO	ERN	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 16 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
METAMIZOL NORMON EFG	500 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 20 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales (FT)	12 meses tras su apertura (P)	
METOCLOPRAMIDA KERN PHARMA EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 250 ml	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
METOCLOPRAMIDA PENSA EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 250 ml	TOWA PHARMACEUTICAL S.A.	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
MINUSTOSAN EFG	1,5 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	MEDOCHEMIE IBERIA, S.A.	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
MISYO	10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION ORAL 1 FRASCO 1000 ml	TILLOMED SPAIN	No conservar a temperatura superior a 25°C (FT)	90 días tras su apertura. Conservar a menos de 25°C en el envase original y protegido de la luz (P)	Una vez que se ha diluido la concentración de 1 mg/ml o 5 mg/ml tiene una duración de 14 días si se conserva en frascos de PET a menos de 25°C y protegido de la luz. Usar antes de 14 días desde la abertura (P)
MOSEGOR	0,25 mg/5 ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	NOVARTIS FARMACEUTICA	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
MOTILIUM	1 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml	ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
MOVICOL	CONCENTRADO PARA SOLUCION ORAL 1 FRASCO 500 ml (SABOR NARANJA)	NORGINE DE ESPAÑA	No refrigerar, no congelar (P)	30 días tras su apertura original del frasco. Una vez que haya diluido en agua, si no puede bebérselo inmediatamente, consévelo tapado. Elimine toda la solución no utilizada en un período de 24 horas (P)	
MUCIBRON	3 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
MUCIBRON FORTE	6 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 250 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.



# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 17 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
MUCOACTIOL	50 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	ALMIRALL S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
MUCOSAN	6 mg/ml JARABE 1 FRASCO 250 ml	OPELLA HEALTHCARE SPAIN, S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
MUCOSAN PEDIATRICO	3 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	OPELLA HEALTHCARE SPAIN, S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
MUXIMED EFG	3 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	ARISTO PHARMA IBERIA S.L.	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
MYCOSTATIN	100.000 UI/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 60 ml	SUBSTIPHARM	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	7 días tras su apertura (FT)	
NABILA EFG	10 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	EXELTIS HEALTHCARE S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura (P)	
NICTUR	360 microgramos/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 15 ml	GP-PHARM, S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	4 semanas tras su apertura siempre y cuando se conserve a temperatura inferior a 30°C, con el envase cerrado (P)	
NOCTAMID	2,5 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 20 ml	TEOFARMA S.R.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
NOOTROPIL	200 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	UCB PHARMA, S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
NORMOTUS ANTITUSIVO	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
NORMOTUS EXPECTORANTE	2 mg/ml + 20 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales (P)	12 meses tras su apertura (P)	
NOTUS ANTITUSIVO	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	TEVA PHARMA	No requiere condiciones especiales. No congelar (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
NOTUS ANTITUSIVO Y EXPECTORANTE	2 mg/ml + 20 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	TEVA PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	12 meses tras su apertura (P)	
NOTUS MUCOLITICO	50 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	TEVA PHARMA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	12 meses tras su apertura (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 18 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
NOVAG TUSS	10 mg/5 ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	TARBIS FARMA, S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
NUROFEN PEDIATRICO	40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 150 ml (SABOR FRESA)	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	6 meses tras su apertura (P)	
NUROFEN PEDIATRICO	20 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml (SABOR NARANJA)	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, S.A.	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	6 meses tras su apertura (P)	
ORAMORPH	X mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	KKI NEWCO SPAIN, S.L.	Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	3 meses tras su apertura (P)	
ORDELAX	756,6 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 500 ml	ORDESA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
OXYNORM CONCENTRADO	10 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 30 ml	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
PAIDOCORT	3 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 125 ml	ALDO UNION	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	2 meses tras su apertura (P)	
PAIDOFEBRIL	20 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml	ALDO UNION	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
PAIDOTERIN DESCONGESTIVO	JARABE 1 FRASCO 100 ml	ALDO UNION	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	Evitar temperaturas excesivamente bajas (P)
PARACETAMOL KERN PHARMA EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	KERN PHARMA	Conservar en el envase original perfectamente cerrado (P)	6 meses tras su apertura (P)	
PARACETAMOL LEVEL EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	ERN	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
PARACETAMOL/CODEINA LEVEL	24 mg/ml + 2,4 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 240 ml	ERN	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
PARACODINA	2,4 mg/ml JARABE 1 FRASCO 150 ml	TEOFARMA S.R.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 19 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
PARLATOS	2,6 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	PHARMEX ADVANCED LABORATORIES, S. L	No requiere condiciones especiales. No congelar (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
PECTOX	50 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 240 ml	ITALFARMACO	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
PECTOX FORTE	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	ITALFARMACO	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
PEZIMAX	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml	NEURAXPHARM SPAIN S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	2 meses tras su apertura (P)	
POLARAMINE	0,4 mg/ml JARABE 1 FRASCO 60 ml	ROVI	No requiere condiciones especiales (P)	2 meses tras su apertura (P)	
PRAMEP EFG	20 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 473 ml	STADA S. L	No requiere condiciones especiales (P)	2 meses tras su apertura (P)	
PRANZO	62,5 mg/ml + 1,25 mg/ml + 0,5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	VIÑAS	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
PREMAX EFG	20 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 473 ml	NEURAXPHARM SPAIN S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	2 meses tras su apertura (P)	
PRIMPERAN	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	SANOFI AVENTIS S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (DL-T, P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (dl-t, P)	
PROPALCOF	15 mg/5 ml JARABE 1 FRASCO	BAYER HISPANIA S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
PROSPANTUS	JARABE 1 FRASCO	FERRER INTERNACIONAL	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
PSICO SOMA	LIQUIDO ORAL 1 FRASCO 80 ml	FERRER INTERNACIONAL	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura (P)	
RAPAMUNE	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 60 ml	PFIZER	Conservar en nevera entre 2°C y 8°C. Conservar en el frasco original para protegerlo de la luz (P)	30 días tras su apertura (P)	En las jeringas dosificadoras 24 horas (a temperatura ambiente, pero sin sobrepasar los 25°C)
REMINYL	4 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	JANSSEN-CILAG	No congelar (P)	3 meses tras su apertura (P)	
RESPIDINA EXPECTORANTE JUNIOR	20 mg/ml + 6 mg/ml JARABE 1 FRASCO 120 ml	CINFA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	12 meses tras su apertura (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 20 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
RIFALDIN	100 mg/5 ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 120 ml	SANOFI AVENTIS S.A.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
RINIALER	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	LABORATORIOS BIAL	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
RISPERDAL	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	JANSSEN-CILAG	No conservar a temperatura superior a 30°C. No congelar ni refrigerar (P)	3 meses tras su apertura (P)	
RISPERIDONA ARISTO EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	ARISTO PHARMA IBERIA S.L.	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	3 meses tras su apertura (P)	
RISPERIDONA AUROVITAS EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	AUROVITAS SPAIN S.A.U.	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura (P)	
RISPERIDONA CINFA EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	CINFA	No conservar a temperatura superior a 30°C. No congelar. Conservar en el envase original (P)	3 meses tras su apertura (P)	
RISPERIDONA CODRAMOL EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 30 ml	FARMALIDER	No conservar a temperatura superior a 30°C. No conservar a temperatura inferior a 15°C. No congelar. Mantener en el envase original (P)	3 meses tras su apertura (P)	
RISPERIDONA FARMALID EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 30 ml	FARMALIDER	No conservar a temperatura superior a 30°C. No congelar. Mantener en el envase original (P)	3 meses tras su apertura (P)	
RISPERIDONA KERN PHARMA EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	KERN PHARMA	No conservar a temperatura superior a 25°C. No congelar (FT)	3 meses tras su apertura (FT)	
RISPERIDONA NORMON EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	NORMON	No requiere condiciones especiales. No congelar. Conservar en el envase original (P)	3 meses tras su apertura (P)	
RISPERIDONA STADA EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	STADA S. L	No conservar a temperatura superior a 30°C. No congelar. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	3 meses tras su apertura (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 21 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
RISPERIDONA TARBIS EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	TARBIS FARMA, S.L.	No conservar a temperatura superior a 30°C. No congelar. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz y de la humedad (P)	3 meses tras su apertura (P)	
RISPERIDONA TEVA EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	TEVA PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura (P)	
RISPERIDONA VIATRIS EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L.	No conservar a temperatura superior a 30°C. No congelar ni refrigerar. Conservar en el envase original (P)	4 meses tras su apertura (P)	
RIVASTIGMINA CINFA EFG	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml + JERINGA DOSIFICADORA	CINFA	No requiere condiciones especiales (P)	1 mes tras su apertura (P)	
RIVASTIGMINA COMBIX EFG	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml + JERINGA DOSIFICADORA	COMBIX	No requiere condiciones especiales (P)	1 mes tras su apertura (P)	
RIVASTIGMINA KERN PHARMA EFG	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml + JERINGA DOSIFICADORA	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	1 mes tras su apertura (P)	
RIVASTIGMINA NORMON EFG	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	NORMON	No requiere condiciones especiales. No congelar o refrigerar. Mantener en posición vertical (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
RIVASTIGMINA ORTODROL EFG	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml + JERINGA DOSIFICADORA	INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA VIR	No requiere condiciones especiales (P)	1 mes tras su apertura (P)	
RIVASTIGMINA SANDOZ EFG	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	SANDOZ FARMACEUTICA S.A.	No conservar a temperatura superior a 30°C. No congelar ni refrigerar. Mantener en posición vertical (P)	1 mes tras su apertura (P)	
RIVASTIGMINA VIR EFG	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml + JERINGA DOSIFICADORA	INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA VIR	No requiere condiciones especiales (P)	2 meses tras su apertura (P)	
RIVOTRIL	2,5 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	RUBIO	No conservar a temperatura superior a 30°C. Conservar en el envase original (P)	120 días tras su apertura (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 22 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
ROTARIX	10 DOSIS SUSPENSION ORAL EN TUBO 10 TUBOS DOSIFICADORES PRECARGADOS 1,5 ml	GLAXO SMITHKLINE	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	120 días tras su apertura (FT)	
ROTATEQ	SOLUCION ORAL 1 TUBO 2 ml	MSD	Conservar en nevera entre 2°C y 8°C. Conservar el tubo dosificador en el envase original para protegerlo de la luz (P)	Debe administrarse inmediatamente después de ser extraído de la nevera (P)	
RUPAFIN	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 120 ml	ERN	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
SALVACOLINA	0,2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 100 ml	SALVAT	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
SANDIMMUN NEORAL	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 50 ml + JERINGA DOSIFICADORA	NOVARTIS FARMACEUTICA	Conservar a temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). No refrigerar. No conservar por debajo de 20°C durante más de 1 mes (P)	2 meses tras su apertura (P)	
SEKISAN	3,54 mg/ml JARABE 1 FRASCO	ALMIRALL S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
SENIORAL	JARABE I	ERN	Conservar en el envase original perfectamente cerrado (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
SEPTRIN PEDIATRICO	40 mg/ml + 8 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 100 ml	TEOFARMA S.R.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	1 mes tras su apertura (P)	
SERC	8 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 60 ml	NEURAXPHARM SPAIN S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
SILOCALM	1 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 150 ml	MEDICARE PHARMA	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	28 días tras su apertura (P)	
SINOGAN	40 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 30 ml	NEURAXPHARM SPAIN S.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	6 meses tras su apertura (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 23 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
SOLIAN	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 60 ml	SANOFI AVENTIS S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
SOLSINT	X microgramos SOLUCION ORAL	INSTITUTO BIOQUIMICO IBERICO IBSA S.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	15 días tras su apertura (P)	
SOMAZINA	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 30 ml	FERRER INTERNACIONAL	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
STRATTERA	4 mg/ml SOLUCION ORAL 3 FRASCOS 100 ml	IRISFARMA	No requiere condiciones especiales (P)	45 días tras su apertura (P)	
SUTIF	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml	BIOWISE PHARMACEUTICALS	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
TANAKENE	40 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 50 ml	FAES FARMA	Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	Puede presentar ligeras variaciones de color, sin que por ello varíe en absoluto su actividad
TEDIPRIMA	16 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 100 ml	ESTEDI	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
TERBASMIN	0,3 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 180 ml	ERN	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
TERBASMIN EXPECTORANTE	0,3 mg/ml + 13,3 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 180 ml	ERN	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
TIAPRIZAL	12 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 60 ml	NEURAXPHARM SPAIN S.L.	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
TIONER	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 30 ml	ARISTO PHARMA IBERIA S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	12 meses tras su apertura (P)	
TOSEINA	2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 250 ml	ITALFARMACO	Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
TOSIDRIN	10 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO	FARDI	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
TOSSEVO EFG	6 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	STADA S. L	No conservar a temperatura superior a 25°C (P)	6 meses tras su apertura (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 24 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
TRAMADOL ASTA MEDICA EFG	100 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 10 ml	VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L.	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
TRAMADOL VIR EFG	100 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO	INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA VIR	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
TRANKIMAZIN	0,75 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 20 ml	VIATRIS HEALTHCARE S.L.	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	3 meses tras su apertura (P)	
TRILEPTAL	60 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 250 ml	NOVARTIS FARMACEUTICA	No requiere condiciones especiales (P)	7 semanas tras su apertura (P)	
TRILOMBRIN	250 mg/5 ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 30 ml	FARMASIERRA LABORATORIOS S. L	Conservar a temperatura ambiente (de 15°C a 30°C) (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
TROXERUTINA KERN PHARMA EFG	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
TUSCALMAN	3 mg/ml JARABE 1 FRASCO 150 ml	DESMA	Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	6 meses tras su apertura (P)	
TUSCLIN	7 mg/ml JARABE 1 FRASCO 100 ml	ERN	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura (P)	
TUSELIN DESCONGESTIVO	2 mg/ml + 1 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	KORHISPANA	Conservar en el envase original para protegerlo de la luz. No congelar (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
TUTUKON	SOLUCION ORAL 1 FRASCO 250 ml	SETONDA	No requiere condiciones especiales (P)	12 días tras su apertura (P)	
VALDISPERT	100 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 30 ml	VEMEDIA PHARMA HISPANIA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
VARIARGIL	40 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 50 ml	ITALFARMACO	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
VENTOLIN	2 mg/5 ml JARABE 1 FRASCO 150 ml	GLAXO SMITHKLINE	No conservar a temperatura superior a 30°C. Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.



# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas García<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 25 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
VESICARE	1 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 150 ml	ASTELLAS PHARMA	No requiere condiciones especiales. Conservar en el frasco original para protegerlo de la luz (P)	28 días tras su apertura (P)	Guarde la jeringa oral limpia y seca en un lugar protegido de la luz solar y el calor.
VIBRACINA	50 mg/5 ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 60 ml	PFIZER	No conservar a temperatura superior a 30°C. Conservar en el envase original (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
VIMPAT	10 mg/ml JARABE 1 FRASCO 200 ml	UCB PHARMA, S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	6 meses tras su apertura (P)	
VISCOTEINA	50 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	FAES FARMA	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
VITAMINA D3 KERN PHARMA	2000 UI/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	KERN PHARMA	No requiere condiciones especiales (FT)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
WELLVONE	750 mg/5 ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 226 ml	GLAXO SMITHKLINE	No conservar a temperatura superior a 25°C. No congelar (P)	21 días tras su apertura (P)	
XAZAL	0,5 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 200 ml	UCB PHARMA, S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura (P)	
XAZAL	5 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 20 ml	UCB PHARMA, S.A.	Conservar en el envase original para protegerlo de la luz (P)	3 meses tras su apertura (P)	
XELJANZ	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 250 ml	PFIZER	No requiere condiciones especiales. Conservar en el envase original para protegerlo de la humedad (P)	60 días tras su apertura (P)	
ZAMENE	22,75 mg/ml GOTAS ORALES EN SUSPENSION 1 FRASCO 13 ml	MENARINI	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses siempre y cuando se conserve a temperatura inferior a 30°C (P)	
ZASTEN	0,2 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml	ALFASIGMA ESPAÑA S.L.	No requiere condiciones especiales. Conservar en envase original (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ZAYASEL EFG	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO 150 ml	SALVAT	No requiere condiciones especiales (P)	La misma del envase, siempre que las condiciones sean las idóneas (P)	
ZEBINIX	50 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml	LABORATORIOS BIAL	No requiere condiciones especiales (P)	2 meses tras su apertura (P)	

CE: INFORMACIÓN OBTENIDA POR CORREO ELECTRÓNICO AL LABORATORIO.

P: INFORMACIÓN OBTENIDA DEL PROSPECTO.

FT: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA FICHA TÉCNICA.

DL-T: DATOS FACILITADOS POR EL LABORATORIO VÍA TELEFÓNICA.

# PERÍODO DE VALIDEZ DE LOS ENVASES DE SOLUCIONES ORALES TRAS SU APERTURA

Uxia Grela Casal<sup>1</sup>, Natividad Rivas Garcia<sup>1</sup> y Coral Lomba Brandón<sup>1</sup>  
Centro de Información del Medicamento. Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense

Página 26 de 26

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LABORATORIO	CONSERVACIÓN ENVASE ABIERTO	CADUCIDAD ENVASE ABIERTO	NOTAS
ZOVIRAX	80 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 100 ml	GLAXO SMITHKLINE	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	15 días tras su apertura siempre y cuando se conserve a temperatura inferior a 25°C (P)	
ZOVIRAX	80 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 FRASCO 200 ml	GLAXO SMITHKLINE	No conservar a temperatura superior a 30°C (P)	27 días tras su apertura días siempre y cuando se conserve a temperatura inferior a 25°C (P)	
ZYRTEC	1 mg/ml SOLUCION ORAL 1 FRASCO	UCB PHARMA, S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura (P)	
ZYRTEC	10 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 FRASCO 20 ml	UCB PHARMA, S.A.	No requiere condiciones especiales (P)	3 meses tras su apertura (P)	

## BIBLIOGRAFÍA:

- de Medicamentos y Productos Sanitarios AE. :: CIMA :: Centro de información de medicamentos [Internet]. Aemps.es. [citado abril de 2024]. Disponible en: <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>

Última actualización: 04 de abril 2024